



TITLE:

\mathbb{F}_p 代数上の
 \mathbb{G}_a の
 \mathbb{G}_m による非可換な拡大について (代数的整数論とその周辺)

AUTHOR(S):

原口, 幸

CITATION:

原口, 幸. \mathbb{F}_p 代数上の \mathbb{G}_a の \mathbb{G}_m による非可換な拡大について (代数的整数論とその周辺). 数理解析研究所講究録 2004, 1376: 181-191

ISSUE DATE:

2004-05

URL:

<http://hdl.handle.net/2433/25629>

RIGHT:

\mathbb{F}_p 代数上の \mathbb{G}_a の \mathbb{G}_m による非可換な拡大について

中央大学・数学専攻 (M2) 原口 幸 (Yuki Haraguchi)

Department of Mathematics,
Chuo University

1. 序

S をスキーム, G を S の上の群スキーム, H を G が作用する S の上の可換群スキームとする. G の H による拡大の同値類のなす群 $\text{Ext}_S^1(G, H)$ を決定すること, あるいは, G と H が線型的である場合に $\text{Ext}_S^1(G, H)$ の部分群である Hochschild cohomology 群 $H^2(G, H)$ を決定すること, さらに, G が可換で G の H の上への作用が自明である場合に $H^2(G, H)$ の部分群である対称 Hochschild cohomology 群 $H_0^2(G, H)$ を決定することは群スキームの理論の中でも重要な問題であるが, $S = \text{Spec } K$ (K は体) の場合, 基本的な群スキームに対する結果が Demazure-Gabriel [1] に集大成されている. そこでは, 例えば, 加法群スキーム \mathbb{G}_a の乗法群スキーム \mathbb{G}_m による拡大は自明なものに限ることが示されている.

このような研究を一般の環 A の上で展開することは自然な試みであろうが, 関口-諏訪 [2] で一般に $H^2(\mathbb{G}_{a,A}, \mathbb{G}_{m,A}) = 0$ とは限らないことが注意され, A が \mathbb{F}_p 代数である場合に $H_0^2(\mathbb{G}_{a,A}, \mathbb{G}_{m,A})$ の構造が解明された. これで, A が \mathbb{F}_p 代数であるとき, $\mathbb{G}_{a,A}$ の $\mathbb{G}_{m,A}$ による可換な拡大が決定された訳であるが, 非可換な拡大については一つ例が示されているだけで, それ以降非可換な拡大の研究は手付かずであった.

本稿では \mathbb{G}_a の \mathbb{G}_m による非可換な拡大について新たに得られた結果を提示した. その中で最も重要な定理は, A が \mathbb{F}_p 代数である場合, $H^2(\widehat{\mathbb{G}}_{a,A}, \widehat{\mathbb{G}}_{m,A})/H_0^2(\widehat{\mathbb{G}}_{a,A}, \widehat{\mathbb{G}}_{m,A})$ と $H^2(\mathbb{G}_{a,A}, \mathbb{G}_{m,A})/H_0^2(\mathbb{G}_{a,A}, \mathbb{G}_{m,A})$ の具体的に完全な記述である. その系として, A が \mathbb{F}_p 代数であるときに, 非可換な拡大も含めて $\widehat{\mathbb{G}}_a$ の $\widehat{\mathbb{G}}_m$ による, あるいは \mathbb{G}_a の \mathbb{G}_m による拡大がすべて決定された.

2. 主定理

記号 2.1. p を素数, A を \mathbb{F}_p 代数, $W(A)$ を A の元を成分に持つ Witt vector のなす群, $F: W(A) \rightarrow W(A)$ を Frobenius 準同型とする. また,

$$E_p(T) = \exp\left(\sum_{r=0}^{\infty} \frac{T^{p^r}}{p^r}\right) \in \mathbb{Z}_{(p)}[[T]] \quad : \text{Artin-Hasse exponential series}$$

とし, $\mathbf{a} \in W(A)$ に対して, $E_p(\mathbf{a}; T) = \prod_{r \geq 0} E_p(a_r T^{p^r})$ とおく.

2.2. A を環とする. 乗法群 $Z^2(\mathbb{G}_{a,A}, \mathbb{G}_{m,A})$, $Z_0^2(\mathbb{G}_{a,A}, \mathbb{G}_{m,A})$, $B^2(\mathbb{G}_{a,A}, \mathbb{G}_{m,A})$ はそれ

それ

$$\begin{aligned}
 Z^2(\mathbb{G}_{a,A}, \mathbb{G}_{m,A}) &= \left\{ F(X, Y) \in A[X, Y]^\times ; \begin{array}{l} F(X, Y)F(X+Y, Z) \\ = F(X, Y+Z)F(Y, Z) \end{array} \right\}, \\
 Z_0^2(\mathbb{G}_{a,A}, \mathbb{G}_{m,A}) &= \left\{ F(X, Y) \in A[X, Y]^\times ; \begin{array}{l} F(X, Y)F(X+Y, Z) \\ = F(X, Y+Z)F(Y, Z), \\ F(X, Y) = F(Y, X) \end{array} \right\}, \\
 B^2(\mathbb{G}_{a,A}, \mathbb{G}_{m,A}) &= \left\{ \frac{F(X)F(Y)}{F(X+Y)} ; F(T) \in A[T]^\times \right\}
 \end{aligned}$$

によって定義される。このとき,

$$B^2(\mathbb{G}_{a,A}, \mathbb{G}_{m,A}) \subset Z_0^2(\mathbb{G}_{a,A}, \mathbb{G}_{m,A}) \subset Z^2(\mathbb{G}_{a,A}, \mathbb{G}_{m,A})$$

であり, Hochschild cohomology 群と対称 Hochschild cohomology 群をそれぞれ

$$H^2(\mathbb{G}_{a,A}, \mathbb{G}_{m,A}) = Z^2(\mathbb{G}_{a,A}, \mathbb{G}_{m,A})/B^2(\mathbb{G}_{a,A}, \mathbb{G}_{m,A}),$$

$$H_0^2(\mathbb{G}_{a,A}, \mathbb{G}_{m,A}) = Z_0^2(\mathbb{G}_{a,A}, \mathbb{G}_{m,A})/B^2(\mathbb{G}_{a,A}, \mathbb{G}_{m,A})$$

とおく。

加法群 $Z(\mathbb{G}_{a,A}, \mathbb{G}_{a,A})$, $Z_0^2(\mathbb{G}_{a,A}, \mathbb{G}_{a,A})$, $B^2(\mathbb{G}_{a,A}, \mathbb{G}_{a,A})$ はそれぞれ

$$\begin{aligned}
 Z^2(\mathbb{G}_{a,A}, \mathbb{G}_{a,A}) &= \left\{ F(X, Y) \in A[X, Y] ; \begin{array}{l} F(X, Y) + F(X+Y, Z) \\ = F(X, Y+Z) + F(Y, Z) \end{array} \right\}, \\
 Z_0^2(\mathbb{G}_{a,A}, \mathbb{G}_{a,A}) &= \left\{ F(X, Y) \in A[X, Y] ; \begin{array}{l} F(X, Y) + F(X+Y, Z) \\ = F(X, Y+Z) + F(Y, Z), \\ F(X, Y) = F(Y, X) \end{array} \right\}, \\
 B^2(\mathbb{G}_{a,A}, \mathbb{G}_{a,A}) &= \{F(X) + F(Y) - F(X+Y) ; F(T) \in A[T]\}
 \end{aligned}$$

によって定義される。このとき,

$$B^2(\mathbb{G}_{a,A}, \mathbb{G}_{a,A}) \subset Z_0^2(\mathbb{G}_{a,A}, \mathbb{G}_{a,A}) \subset Z^2(\mathbb{G}_{a,A}, \mathbb{G}_{a,A})$$

であり, Hochschild cohomology 群と対称 Hochschild cohomology 群をそれぞれ

$$H^2(\mathbb{G}_{a,A}, \mathbb{G}_{a,A}) = Z^2(\mathbb{G}_{a,A}, \mathbb{G}_{a,A})/B^2(\mathbb{G}_{a,A}, \mathbb{G}_{a,A}),$$

$$H_0^2(\mathbb{G}_{a,A}, \mathbb{G}_{a,A}) = Z_0^2(\mathbb{G}_{a,A}, \mathbb{G}_{a,A})/B^2(\mathbb{G}_{a,A}, \mathbb{G}_{a,A})$$

とおく。

このとき, 次のことが知られている:

- 1) $H^2(\mathbb{G}_{a,A}, \mathbb{G}_{m,A})$ は, $\mathbb{G}_{a,A}$ の $\mathbb{G}_{m,A}$ による A -scheme の拡大として split する中心拡

大の同値類のなす群と同型である.

2) $H_0^2(\mathbb{G}_{a,A}, \mathbb{G}_{m,A})$ は, $\mathbb{G}_{a,A}$ の $\mathbb{G}_{m,A}$ による A -scheme の拡大として split する可換な拡大の同値類のなす群と同型である.

3) $H^2(\mathbb{G}_{a,A}, \mathbb{G}_{a,A})$ は $\mathbb{G}_{a,A}$ の $\mathbb{G}_{a,A}$ による中心拡大の同値類のなす群と同型である.

4) $H_0^2(\mathbb{G}_{a,A}, \mathbb{G}_{a,A})$ は $\mathbb{G}_{a,A}$ の $\mathbb{G}_{a,A}$ による可換な拡大の同値類のなす群と同型である.

2.3. A を環とする. 乗法的形式群 $Z^2(\widehat{\mathbb{G}}_{a,A}, \widehat{\mathbb{G}}_{m,A})$, $Z_0^2(\widehat{\mathbb{G}}_{a,A}, \widehat{\mathbb{G}}_{m,A})$, $B^2(\widehat{\mathbb{G}}_{a,A}, \widehat{\mathbb{G}}_{m,A})$ はそれぞれ

$$\begin{aligned} Z^2(\widehat{\mathbb{G}}_{a,A}, \widehat{\mathbb{G}}_{m,A}) &= \left\{ F(X, Y) \in A[[X, Y]]^\times ; \begin{array}{l} F(X, Y) \equiv 1 \pmod{\deg 1}, \\ F(X, Y)F(X+Y, Z) \\ = F(X, Y+Z)F(Y, Z) \end{array} \right\}, \\ Z_0^2(\widehat{\mathbb{G}}_{a,A}, \widehat{\mathbb{G}}_{m,A}) &= \left\{ F(X, Y) \in A[[X, Y]]^\times ; \begin{array}{l} F(X, Y) \equiv 1 \pmod{\deg 1}, \\ F(X, Y)F(X+Y, Z) \\ = F(X, Y+Z)F(Y, Z), \\ F(X, Y) = F(Y, X) \end{array} \right\}, \\ B^2(\widehat{\mathbb{G}}_{a,A}, \widehat{\mathbb{G}}_{m,A}) &= \left\{ \frac{F(X)F(Y)}{F(X+Y)} ; F(T) \in A[[T]]^\times, F(T) \equiv 1 \pmod{\deg 1} \right\} \end{aligned}$$

によって定義される. このとき,

$$B^2(\widehat{\mathbb{G}}_{a,A}, \widehat{\mathbb{G}}_{m,A}) \subset Z_0^2(\widehat{\mathbb{G}}_{a,A}, \widehat{\mathbb{G}}_{m,A}) \subset Z^2(\widehat{\mathbb{G}}_{a,A}, \widehat{\mathbb{G}}_{m,A})$$

であり, Hochschild cohomology 群と対称 Hochschild cohomology 群をそれぞれ

$$\begin{aligned} H^2(\widehat{\mathbb{G}}_{a,A}, \widehat{\mathbb{G}}_{m,A}) &= Z^2(\widehat{\mathbb{G}}_{a,A}, \widehat{\mathbb{G}}_{m,A}) / B^2(\widehat{\mathbb{G}}_{a,A}, \widehat{\mathbb{G}}_{m,A}), \\ H_0^2(\widehat{\mathbb{G}}_{a,A}, \widehat{\mathbb{G}}_{m,A}) &= Z_0^2(\widehat{\mathbb{G}}_{a,A}, \widehat{\mathbb{G}}_{m,A}) / B^2(\widehat{\mathbb{G}}_{a,A}, \widehat{\mathbb{G}}_{m,A}) \end{aligned}$$

とおく.

加法的形式群 $Z(\widehat{\mathbb{G}}_{a,A}, \widehat{\mathbb{G}}_{a,A})$, $Z_0^2(\widehat{\mathbb{G}}_{a,A}, \widehat{\mathbb{G}}_{a,A})$, $B^2(\widehat{\mathbb{G}}_{a,A}, \widehat{\mathbb{G}}_{a,A})$ はそれぞれ

$$\begin{aligned} Z^2(\widehat{\mathbb{G}}_{a,A}, \widehat{\mathbb{G}}_{a,A}) &= \left\{ F(X, Y) \in A[[X, Y]] ; \begin{array}{l} F(X, Y) \equiv 0 \pmod{\deg 1}, \\ F(X, Y) + F(X+Y, Z) \\ = F(X, Y+Z) + F(Y, Z) \end{array} \right\}, \\ Z_0^2(\widehat{\mathbb{G}}_{a,A}, \widehat{\mathbb{G}}_{a,A}) &= \left\{ F(X, Y) \in A[[X, Y]] ; \begin{array}{l} F(X, Y) \equiv 0 \pmod{\deg 1}, \\ F(X, Y) + F(X+Y, Z) \\ = F(X, Y+Z) + F(Y, Z), \\ F(X, Y) = F(Y, X) \end{array} \right\}, \\ B^2(\widehat{\mathbb{G}}_{a,A}, \widehat{\mathbb{G}}_{a,A}) &= \{ F(X) + F(Y) - F(X+Y) ; F(T) \in A[[T]], F(T) \equiv 0 \pmod{\deg 1} \} \end{aligned}$$

によって定義される. このとき,

$$B^2(\widehat{\mathbb{G}}_{a,A}, \widehat{\mathbb{G}}_{a,A}) \subset Z_0^2(\widehat{\mathbb{G}}_{a,A}, \widehat{\mathbb{G}}_{a,A}) \subset Z^2(\widehat{\mathbb{G}}_{a,A}, \widehat{\mathbb{G}}_{a,A})$$

であり, Hochschild cohomology 群と対称 Hochschild cohomology 群をそれぞれ

$$H^2(\widehat{\mathbb{G}}_{a,A}, \widehat{\mathbb{G}}_{a,A}) = Z^2(\widehat{\mathbb{G}}_{a,A}, \widehat{\mathbb{G}}_{a,A})/B^2(\widehat{\mathbb{G}}_{a,A}, \widehat{\mathbb{G}}_{a,A}),$$

$$H_0^2(\widehat{\mathbb{G}}_{a,A}, \widehat{\mathbb{G}}_{a,A}) = Z_0^2(\widehat{\mathbb{G}}_{a,A}, \widehat{\mathbb{G}}_{a,A})/B^2(\widehat{\mathbb{G}}_{a,A}, \widehat{\mathbb{G}}_{a,A})$$

とおく.

このとき, 次のことが知られている:

- 1) $H^2(\widehat{\mathbb{G}}_{a,A}, \widehat{\mathbb{G}}_{m,A})$ は, $\widehat{\mathbb{G}}_{a,A}$ の $\widehat{\mathbb{G}}_{m,A}$ による形式的 A -scheme の拡大として split する中心拡大の同値類のなす群と同型である.
- 2) $H_0^2(\widehat{\mathbb{G}}_{a,A}, \widehat{\mathbb{G}}_{m,A})$ は, $\widehat{\mathbb{G}}_{a,A}$ の $\widehat{\mathbb{G}}_{m,A}$ による形式的 A -scheme の拡大として split する可換な拡大の同値類のなす群と同型である.
- 3) $H^2(\widehat{\mathbb{G}}_{a,A}, \widehat{\mathbb{G}}_{a,A})$ は $\widehat{\mathbb{G}}_{a,A}$ の $\widehat{\mathbb{G}}_{a,A}$ による中心拡大の同値類のなす群と同型である.
- 4) $H_0^2(\widehat{\mathbb{G}}_{a,A}, \widehat{\mathbb{G}}_{a,A})$ は $\widehat{\mathbb{G}}_{a,A}$ の $\widehat{\mathbb{G}}_{a,A}$ による可換な拡大の同値類のなす群と同型である.

2.4. ここで, $F(T) \in \text{Hom}_{A\text{-gr}}(\widehat{\mathbb{G}}_{a,A}, \widehat{\mathbb{G}}_{m,A})$, $G(X, Y) \in Z^2(\widehat{\mathbb{G}}_{a,A}, \widehat{\mathbb{G}}_{a,A})$ とする. このとき, $F(G(X, Y)) \in Z^2(\widehat{\mathbb{G}}_{a,A}, \widehat{\mathbb{G}}_{m,A})$ が成り立つことが分かる. 例えば, $\mathbf{a} = (a_r)_{r \geq 0} \in \text{Ker}[F : W(A) \rightarrow W(A)]$ に対して,

$$E_p(\mathbf{a}; T) = \prod_{r \geq 0} E_p(a_r T^{p^r}) = \prod_{r \geq 0} \left[\sum_{i=0}^{p-1} \frac{(a_r T^{p^r})^i}{i!} \right] \in \text{Hom}_{A\text{-gr}}(\widehat{\mathbb{G}}_{a,A}, \widehat{\mathbb{G}}_{m,A})$$

が成り立つ. さらに,

$$XY^{p^r} \in Z^2(\mathbb{G}_{a,A}, \mathbb{G}_{a,A}) \subset Z^2(\widehat{\mathbb{G}}_{a,A}, \widehat{\mathbb{G}}_{a,A}) \quad (r > 0)$$

なので,

$$E_p(\mathbf{a}; XY^{p^r}) \in Z^2(\widehat{\mathbb{G}}_{a,A}, \widehat{\mathbb{G}}_{m,A})$$

が成り立つ.

逆に, $\widehat{\mathbb{G}}_{m,A}$ に係数を持つ $\widehat{\mathbb{G}}_{a,A}$ の非対称な 2-cocycle は全て上記の方法で得られる. 実際,

定理 2.5. A を \mathbb{F}_p 代数とする. このとき, 対応 $(a_r)_{r \geq 1} \mapsto \prod_{r \geq 1} E_p(a_r; XY^{p^r})$ によって定義される群の準同型

$$\xi : (\text{Ker}[F : W(A) \rightarrow W(A)])^N \rightarrow H^2(\widehat{\mathbb{G}}_{a,A}, \widehat{\mathbb{G}}_{m,A})/H_0^2(\widehat{\mathbb{G}}_{a,A}, \widehat{\mathbb{G}}_{m,A}),$$

$$\xi : (\text{Ker}[F : \widehat{W}(A) \rightarrow \widehat{W}(A)])^{(N)} \rightarrow H^2(\mathbb{G}_{a,A}, \mathbb{G}_{m,A})/H_0^2(\mathbb{G}_{a,A}, \mathbb{G}_{m,A})$$

は同型である.

2.6. [2] で, $U = (U_0, U_1, U_2, \dots)$ に対して形式的巾級数 $F_p(U; X, Y) \in \mathbb{Z}_{(p)}[U][[X, Y]]$ が

$$F_p(U; X, Y) = \prod_{r \geq 0} F_p(U_r; X^{p^r}, Y^{p^r})$$

によって定義されている。ただし,

$$F_p(U; X, Y) = \exp \left(\sum_{i \geq 1} U^{p^i-1} \frac{X^{p^i} + Y^{p^i} - (X+Y)^{p^i}}{p^i} \right)$$

とする。[2] の主結果と合わせて次の結論を得る。

系 2.7. A を \mathbb{F}_p 代数, $P(X, Y) \in Z^2(\widehat{\mathbb{G}}_{a,A}, \widehat{\mathbb{G}}_{m,A})$ (resp. $Z^2(\mathbb{G}_{a,A}, \mathbb{G}_{m,A})$) とする。このとき, $P(X, Y)$ は,

$$F_p(b; X, Y) \prod_{r \geq 1} E_p(a_r; XY^{p^r})$$

の形の 2-cocycle に cohomologous である。ただし, $b \in W(A)$, $(a_r)_{r \geq 1} \in (\text{Ker}[F : W(A) \rightarrow W(A)])^N$ (resp. $b \in \widehat{W}(A)$, $(a_r)_{r \geq 1} \in (\text{Ker}[F : \widehat{W}(A) \rightarrow \widehat{W}(A)])^{(N)}$) とする。

3. 主定理の証明

3.1. まず, 本稿で鍵となる 3 つの事項を引用する。

[1] では, A が体の場合に $H^2(\mathbb{G}_{a,A}, \mathbb{G}_{a,A})$ の具体的な記述が与えられている。この証明を追ってみると, A が \mathbb{F}_p 代数であっても同じ結果が得られることが分かる:

(A) A を \mathbb{F}_p 代数とする。 $P(X, Y) \in Z^2(\mathbb{G}_{a,A}, \mathbb{G}_{a,A})$ であるとき, $P(X, Y)$ は,

$$\sum_{r \geq 1} a_r \frac{(X+Y)^{p^r} - X^{p^r} - Y^{p^r}}{p} + \sum_{0 \leq i < j} b_{ij} X^{p^i} Y^{p^j}, \quad a_r, b_{ij} \in A$$

の形の 2-cocycle に cohomologous である。

[2] では, A が \mathbb{F}_p 代数の場合に $H_0^2(\mathbb{G}_{a,A}, \mathbb{G}_{m,A})$ の具体的な記述が与えられている:

(B) A を \mathbb{F}_p 代数とする。このとき, 対応 $a \mapsto F_p(a; X, Y)$ は群の同型

$$\text{Coker}[F : \widehat{W}(A) \rightarrow \widehat{W}(A)] \xrightarrow{\sim} H_0^2(\mathbb{G}_{a,A}, \mathbb{G}_{m,A}),$$

$$\text{Coker}[F : W(A) \rightarrow W(A)] \xrightarrow{\sim} H_0^2(\widehat{\mathbb{G}}_{a,A}, \widehat{\mathbb{G}}_{m,A})$$

を誘導する。

さらに, 上の結果を得る際, 次のような事実が得られている:

(C) A を \mathbb{F}_p 代数とする。このとき, $G(X, Y) \in Z_0^2(\mathbb{G}_{a,A}, \mathbb{G}_{a,A})$ で $G(X, Y)$ が次数 l の斉次多項式であるとき,

$$F(X, Y) \equiv 1 + G(X, Y) \pmod{\deg(l+1)}$$

をみたす $F(X, Y) \in Z_0^2(\mathbb{G}_{a,A}, \mathbb{G}_{m,A})$ が存在する。

次に, 定理の証明に必要な補題を準備する。

補題 3.2. A を \mathbb{F}_p 代数とし, $F(X, Y) \in Z^2(\widehat{\mathbb{G}}_{a,A}, \widehat{\mathbb{G}}_{m,A})$ とする. このとき,

$$F(X, Y) \equiv 1 \pmod{\deg(p^r + 1)} \quad (r > 0)$$

ならば,

$$F(X, Y)\tilde{F}(X, Y)^{-1} \equiv \sum_{k=0}^{p-1} \frac{1}{k!} \{a_{r,0}XY^{p^r} + a_{r-1,1}X^pY^{p^r} + \cdots + a_{1,r-1}X^{p^{r-1}}Y^{p^r}\}^k \pmod{\deg p(p^r + 1)}$$

となる $\tilde{F}(X, Y) \in Z_0^2(\widehat{\mathbb{G}}_{a,A}, \widehat{\mathbb{G}}_{m,A})$ と $a_{r,0}, a_{r-1,1}, \dots, a_{1,r-1} \in A$ が存在する.

証明.

$$F(X, Y)\tilde{F}(X, Y)^{-1} \equiv \sum_{k=0}^{l+1} \frac{1}{k!} \{a_{r,0}XY^{p^r} + a_{r-1,1}X^pY^{p^r} + \cdots + a_{1,r-1}X^{p^{r-1}}Y^{p^r}\}^k \pmod{\deg(l+2)(p^r + 1)}$$

を満たす $\tilde{F}(X, Y) \in Z_0^2(\widehat{\mathbb{G}}_{a,A}, \widehat{\mathbb{G}}_{m,A})$ と $a_{r,0}, a_{r-1,1}, \dots, a_{1,r-1} \in A$ が存在することを, l ($0 \leq l \leq p-2$) に関する帰納法によって証明する.

Step 1.

$$F(X, Y) \equiv 1 + H(X, Y) \pmod{\deg 2(p^r + 1)}$$

と仮定する. ただし,

$$H(X, Y) = \sum_{i=p^r+1}^{2(p^r+1)-1} H_i(X, Y),$$

$H_i(X, Y)$ は i 次斉次多項式とする. 多項式 $F(X, Y)$ は関数等式

$$F(X, Y)F(X+Y, Z) = F(X, Y+Z)F(Y, Z)$$

を満たすので, $H_i(X, Y)$ は

$$H_i(X, Y) + H_i(X+Y, Z) = H_i(X, Y+Z) + H_i(Y, Z)$$

を満たす. したがって,

$$H(X, Y) + H(X+Y, Z) = H(X, Y+Z) + H(Y, Z)$$

を得る. このとき, (A) より

$$H(X, Y) = \tilde{H}(X, Y) + \{a_{r,0}XY^{p^r} + a_{r-1,1}X^pY^{p^r} + \cdots + a_{1,r-1}X^{p^{r-1}}Y^{p^r}\}$$

を満たす $\tilde{H}(X, Y) \in Z_0^2(\widehat{\mathbb{G}}_{a,A}, \widehat{\mathbb{G}}_{a,A})$ と $a_{r,0}, a_{r-1,1}, \dots, a_{1,r-1} \in A$ が存在する. ここで, $\tilde{H}(X, Y)$ は斉次多項式の和であることに注意する. (C) より

$$\tilde{F}(X, Y) \equiv 1 + \tilde{H}(X, Y) \pmod{\deg 2(p^r + 1)}$$

を満たす $\tilde{F}(X, Y) \in Z_0^2(\widehat{\mathbb{G}}_{a,A}, \widehat{\mathbb{G}}_{m,A})$ が存在するので,

$$F(X, Y)\tilde{F}(X, Y)^{-1} \equiv 1 + \{a_{r,0}XY^{p^r} + a_{r-1,1}X^pY^{p^r} + \cdots + a_{1,r-1}X^{p^{r-1}}Y^{p^r}\} \pmod{\deg 2(p^r + 1)}$$

を得る.

Step 2. 帰納法の仮定より, $l \leq p-2$ に対して

$$F(X, Y) \equiv \sum_{k=0}^l \frac{1}{k!} G(X, Y)^k + H(X, Y) \pmod{\deg (l+2)(p^r + 1)}$$

とおける. ただし,

$$H(X, Y) = \sum_{i=(l+1)(p^r+1)}^{(l+2)(p^r+1)-1} H_i(X, Y),$$

$H_i(X, Y)$ は i 次斉次多項式とし,

$$G(X, Y) = a_{r,0}XY^{p^r} + a_{r-1,1}X^pY^{p^r} + \cdots + a_{1,r-1}X^{p^{r-1}}Y^{p^r}$$

とする. ここで,

$$\left(\sum_{k=0}^l \frac{1}{k!} X^k\right) \left(\sum_{k=0}^l \frac{1}{k!} Y^k\right) - \sum_{k=0}^l \frac{1}{k!} (X+Y)^k \equiv \frac{1}{(l+1)!} \{(X+Y)^{l+1} - X^{l+1} - Y^{l+1}\} \pmod{\deg (l+2)}$$

が成り立つので,

$$\begin{aligned} & \left(\sum_{k=0}^l \frac{1}{k!} G(X, Y)^k\right) \left(\sum_{k=0}^l \frac{1}{k!} G(X+Y, Z)^k\right) \equiv \sum_{k=0}^l \frac{1}{k!} (G(X, Y) + G(X+Y, Z))^k \\ & + \frac{1}{(l+1)!} \{(G(X, Y) + G(X+Y, Z))^{l+1} - G(X, Y)^{l+1} - G(X+Y, Z)^{l+1}\} \\ & \pmod{\deg (l+2)(p^r + 1)} \end{aligned}$$

と

$$\begin{aligned} & \left(\sum_{k=0}^l \frac{1}{k!} G(X, Y+Z)^k\right) \left(\sum_{k=0}^l \frac{1}{k!} G(Y, Z)^k\right) \equiv \sum_{k=0}^l \frac{1}{k!} (G(X, Y+Z) + G(Y, Z))^k \\ & + \frac{1}{(l+1)!} \{(G(X, Y+Z) + G(Y, Z))^{l+1} - G(X, Y+Z)^{l+1} - G(Y, Z)^{l+1}\} \\ & \pmod{\deg (l+2)(p^r + 1)} \end{aligned}$$

を得る. 一方, 多項式 $F(X, Y)$ は関数等式

$$F(X, Y)F(X+Y, Z) = F(X, Y+Z)F(Y, Z)$$

を満たすので,

$$\begin{aligned} & \left\{ \sum_{k=0}^l \frac{1}{k!} G(X, Y)^k + H(X, Y) \right\} \left\{ \sum_{k=0}^l \frac{1}{k!} G(X+Y, Z)^k + H(X+Y, Z) \right\} \\ & \equiv \left\{ \sum_{k=0}^l \frac{1}{k!} G(X, Y+Z)^k + H(X, Y+Z) \right\} \left\{ \sum_{k=0}^l \frac{1}{k!} G(Y, Z)^k + H(Y, Z) \right\} \\ & \qquad \qquad \qquad \text{mod } \deg(l+2)(p^r+1) \end{aligned}$$

が成り立つ. ここで, $i((l+1)(p^r+1) \leq i \leq (l+2)(p^r+1)-1)$ 次の項を比較すると,

$$\begin{aligned} & H(X, Y) + H(X+Y, Z) \\ & \quad + \frac{1}{(l+1)!} \{ (G(X, Y) + G(X+Y, Z))^{l+1} - G(X, Y)^{l+1} - G(X+Y, Z)^{l+1} \} \\ & = H(X, Y+Z) + H(Y, Z) \\ & \quad + \frac{1}{(l+1)!} \{ (G(X, Y+Z) + G(Y, Z))^{l+1} - G(X, Y+Z)^{l+1} - G(Y, Z)^{l+1} \} \end{aligned}$$

を得る. 多項式 $G(X, Y)$ は関数等式

$$G(X, Y) + G(X+Y, Z) = G(X, Y+Z) + G(Y, Z)$$

を満たすので,

$$\begin{aligned} & H(X, Y) + H(X+Y, Z) - \frac{1}{(l+1)!} G(X, Y)^{l+1} - \frac{1}{(l+1)!} G(X+Y, Z)^{l+1} \\ & = H(X, Y+Z) + H(Y, Z) - \frac{1}{(l+1)!} G(X, Y+Z)^{l+1} - \frac{1}{(l+1)!} G(Y, Z)^{l+1} \end{aligned}$$

を得る. このことから,

$$\tilde{H}(X, Y) := H(X, Y) - \frac{1}{(l+1)!} G(X, Y)^{l+1} \in Z^2(\mathbb{G}_{a,A}, \mathbb{G}_{a,A}) \quad (1)$$

が従う. 以下, Step 1 と同様の議論により,

$$\begin{aligned} F(X, Y) \tilde{F}(X, Y)^{-1} & \equiv \left\{ \sum_{k=0}^l \frac{1}{k!} G(X, Y)^k + H(X, Y) \right\} \left\{ 1 - \tilde{H}(X, Y) \right\} \\ & \equiv \sum_{k=0}^l \frac{1}{k!} G(X, Y)^k + \frac{1}{(l+1)!} G(X, Y)^{l+1} \quad \text{mod } \deg(l+2)(p^r+1) \end{aligned}$$

を満たす $\tilde{F}(X, Y) \in Z_0^2(\hat{\mathbb{G}}_{a,A}, \hat{\mathbb{G}}_{m,A})$ が存在することが従う.

補題 3.3. A を \mathbb{F}_p 代数とし, $F(X, Y) \in Z^2(\hat{\mathbb{G}}_{a,A}, \hat{\mathbb{G}}_{m,A})$ とする. このとき, $r > 0$, $a_{r,0}, a_{r-1,1}, \dots, a_{1,r-1} \in A$ に対して,

$$F(X, Y) \equiv \sum_{k=0}^{p-1} \frac{1}{k!} \{ a_{r,0} X Y^{p^r} + a_{r-1,1} X^p Y^{p^r} + \dots + a_{1,r-1} X^{p^{r-1}} Y^{p^r} \}^k \quad \text{mod } \deg p(p^r+1)$$

ならば,

$$a_{r,0}^p = a_{r-1,1}^p = \cdots = a_{1,r-1}^p = 0.$$

証明. 証明は初等的な議論を重ねて出来るが, 幾分長いので詳細は割愛する. 要点は,

$$F(X, Y)F(X + Y, Z) = F(X, Y + Z)F(Y, Z)$$

の両辺を展開して, $XY^{p-1}Z^{p^{r-l}}, XY^{p^{r-l}}Z^{p-1}, X^{p^{r-l}}YZ^{p-1}$ ($0 \leq l \leq r-1$) の項に着目して係数を比較することである.

3.4. 形式的群スキームの場合について, 定理 2.5 を証明する. ξ の全射性を示せば十分である. 以下, 証明の概略を述べる.

$F(X, Y) \in Z^2(\widehat{\mathbb{G}}_{a,A}, \widehat{\mathbb{G}}_{m,A})$ とする. これを定数項で割って, $F(X, Y) \equiv 1 \pmod{\deg 1}$ と仮定してよい. このとき, 補題 3.2 と同じ議論により,

$$F(X, Y)\tilde{F}(X, Y)^{-1} \equiv 1 \pmod{\deg 2p}$$

をみたす $\tilde{F}(X, Y) \in Z_0^2(\widehat{\mathbb{G}}_{a,A}, \widehat{\mathbb{G}}_{m,A})$ が存在することが分かる. $F(X, Y)\tilde{F}(X, Y)^{-1}$ を $F(X, Y)$ で置き換えて,

$$F(X, Y) \equiv 1 \pmod{\deg(p+1)}$$

と仮定する. ここで, 補題 3.2 の $r=1$ の場合を適用して,

$$F(X, Y)\tilde{F}(X, Y)^{-1} \equiv \sum_{k=0}^{p-1} \frac{1}{k!} \{a_{1,0}XY^p\}^k \pmod{\deg p(p+1)}$$

をみたす $\tilde{F}(X, Y) \in Z_0^2(\widehat{\mathbb{G}}_{a,A}, \widehat{\mathbb{G}}_{m,A})$ と $a_{1,0} \in A$ が存在することが分かる. さらに, 補題 3.3 の $r=1$ の場合を適用して,

$$a_{1,0}^p = 0$$

を得る. したがって,

$$F(X, Y)\tilde{F}(X, Y)^{-1} \equiv E_p(a_{1,0}XY^p) \pmod{\deg p(p+1)}$$

であるので,

$$F(X, Y)\tilde{F}(X, Y)^{-1}E_p(a_{1,0}XY^p)^{-1} \equiv 1 \pmod{\deg p(p+1)}$$

を得る. ここで,

$$F(X, Y)\tilde{F}(X, Y)^{-1}E_p(a_{1,0}XY^p)^{-1} \in Z^2(\widehat{\mathbb{G}}_{a,A}, \widehat{\mathbb{G}}_{m,A})$$

であることに注意する. $F(X, Y)\tilde{F}(X, Y)^{-1}E_p(a_{1,0}XY^p)^{-1}$ を $F(X, Y)$ で置き換えて,

$$F(X, Y) \equiv 1 \pmod{\deg(p^2+1)}$$

と仮定する.

この議論を続けていくと,

$$F(X, Y) \tilde{F}(X, Y)^{-1} = \prod_{r=1}^{\infty} \prod_{j=0}^{r-1} E_p(a_{r-j,j} X^{p^j} Y^{p^r}) = \prod_{r=1}^{\infty} \prod_{j=0}^{\infty} E_p(a_{r,j} X^{p^j} Y^{p^{r+j}}) = \prod_{r=1}^{\infty} E_p(a_r; XY^{p^r})$$

をみたす $\tilde{F}(X, Y) \in Z_0^2(\widehat{\mathbb{G}}_{a,A}, \widehat{\mathbb{G}}_{m,A})$ が見つかる. 以上のことから, ξ が全射であることが従う.

群スキームの場合には, 上の結果に次の補題を組み合わせる定理を証明できる.

補題 3.5. A を \mathbb{F}_p 代数とし, $F(X, Y) \in Z^2(\mathbb{G}_{a,A}, \mathbb{G}_{m,A}) \subset A[X, Y]^\times$ とする. このとき,

$$F(X, Y) \tilde{F}(X, Y)^{-1} = \prod_{r \geq 1} E_p(a_r; XY^{p^r})$$

を満たす $\tilde{F}(X, Y) \in Z_0^2(\mathbb{G}_{a,A}, \mathbb{G}_{m,A})$ と $(a_r)_{r \geq 1} \in (\text{Ker}[F : \widehat{W}(A) \rightarrow \widehat{W}(A)])^{(N)}$ が存在する.

証明. 証明の概略を述べる. [2] の主結果を得る過程と合わせて

$$F(X, Y) = \prod_{k \notin \mathbb{P}} \{E_p(a_k X^k) E_p(a_k Y^k) E_p(a_k (X+Y)^k)^{-1}\} \prod_{l \geq 0} F_p(b_l; X^{p^l}, Y^{p^l}) \prod_{r=1}^{\infty} \prod_{j=0}^{r-1} E_p(a_{r-j,j} X^{p^j} Y^{p^r})$$

と表せることにまず注意する. ただし, $\mathbb{P} = \{p^r; r \geq 0\}$ とする. $F(X, Y)$ が多項式であることから, a_k が巾零元で有限個を除いて 0, $b = (b_l)_{l \geq 0} \in \widehat{W}(A)$, $(a_r)_{r \geq 1} \in (\text{Ker}[F : \widehat{W}(A) \rightarrow \widehat{W}(A)])^{(N)}$ であることを示せばよい.

$F(X, Y)$ の次数を N , $F(X, Y)$ の 1 次以上の項の係数で生成される A のイデアルを \mathfrak{a} とする. このとき, 多項式 $F(X, Y)$ は可逆であるので, \mathfrak{a} は巾零イデアルである.

簡単のために, $a_{p^{l+1}} = b_l$,

$$F_k(X, Y) = \begin{cases} F_p(a_{p^{l+1}}; X^{p^l}, Y^{p^l}) & \text{if } k = p^{l+1} \ (l \geq 0) \\ \frac{E_p(a_k X^k) E_p(a_k Y^k)}{E_p(a_k (X+Y)^k)} E_p(a_{r-j,j} X^{p^j} Y^{p^r}) & \text{if } k = p^j + p^r \ (0 \leq j < r) \\ \frac{E_p(a_k X^k) E_p(a_k Y^k)}{E_p(a_k (X+Y)^k)} & \text{otherwise} \end{cases}$$

とおく. このとき,

$$F(X, Y) = \prod_{k=2}^{\infty} F_k(X, Y),$$

$k+1$ 次以上を除いて,

$$F_k(X, Y) \equiv \begin{cases} 1 + a_{p^{l+1}} \frac{X^{p^{l+1}} + Y^{p^{l+1}} - (X+Y)^{p^{l+1}}}{p} & \text{if } k = p^{l+1} \ (l \geq 0) \\ 1 + a_k \{X^k + Y^k - (X+Y)^k\} + a_{r-j,j} X^{p^j} Y^{p^r} & \text{if } k = p^j + p^r \ (0 \leq j < r) \\ 1 + a_k \{X^k + Y^k - (X+Y)^k\} & \text{otherwise} \end{cases}$$

となる. さらに,

$$F_k(X, Y) = 1 + \sum_{l \geq k} \sum_{i+j=l} b_{ij} X^i Y^j, \quad b_{ij} \in A$$

とすると, $i+j=k$ である全ての組 (i, j) に対して $b_{ij} \in \mathfrak{a}^s$ ならば, $i+j > k$ である全ての組 (i, j) に対して $b_{ij} \in \mathfrak{a}^{s+[(i+j)/k]-1}$ が成り立つ.

このとき, 次のことが従う:

- (1) $\begin{cases} k \leq N \text{ ならば } a_k \in \mathfrak{a} \\ p^j + p^r \leq N \text{ ならば } a_{r-j,j} \in \mathfrak{a} \end{cases};$
- (2) $\begin{cases} (s-1)N < k \leq N \text{ ならば } a_k \in \mathfrak{a}^s \\ (s-1)N < p^j + p^r \leq N \text{ ならば } a_{r-j,j} \in \mathfrak{a}^s. \end{cases}$

したがって, a_k と $a_{r-j,j}$ は全ての k と組 (r, j) ($0 \leq j < r$) に対して巾零元で, 有限個を除いて $a_k = 0, a_{r-j,j} = 0$ である.

最後に. 詳しくは [3] を参照して下さい.

参考文献

- [1] M.Demazure and P.Gabriel, *Groupes algébriques, Tome1*, Masson-North-Holland, Paris-Amsterdam, 1970.
- [2] T.Sekiguchi and N.Suwa, *A note on extensions of algebraic and formal groups I*, Math.Z.206 (1991), 567-575.
- [3] Y.Haraguchi, *On non-commutative extensions of \mathbb{G}_a by \mathbb{G}_m over an \mathbb{F}_p -algebra*, Preprint (2004).